Ufficio: DAR/PF

Roma, 25.03.2022

Protocollo: 202200004408/AG

Oggetto: AIFA modifica schema posologico Comirnaty e Spikevax

Circolare n. 13605

8.4

Sito sì

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Modifica schema posologico vaccini anti Covid- 19 Comirnaty e Spikevax.

Si segnala che, con due distinte determinazioni AIFA, entrambe in data 18 marzo 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.3.2022, è stato modificato lo schema posologico del vaccino anti Covid-19 Comirnaty ([clicca qui](#)) e lo schema posologico del vaccino anti Covid-19 Spikevax ([clicca qui](#)).

Per quanto riguarda il **vaccino Comirnaty**, è possibile somministrare una dose di richiamo (terza dose) per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la seconda dose a soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/001 - A.I.C.: 049269018/E - In base 32: 1GZL8U:

30 mcg - concentrato per dispersione iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,45 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);

EU/1/20/1528/002 - A.I.C.: 049269020/E - In base 32: 1GZL8W:

30 mcg - dispersione per preparazione iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 10 flaconcini multidose (60 dosi);

EU/1/20/1528/003 - A.I.C.: 049269032/E - In base 32: 01GZL8:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

30 mcg - dispersione per preparazione iniettabile – uso intramuscolare -
flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);

EU/1/20/1528/004 - A.I.C.: 049269044/E - In base 32: 01GZLN:

10 mcg - concentrato per dispersione iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino
(vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi);

EU/1/20/1528/005 - A.I.C.: 049269057/E - In base 32: 1GZLB1:

10 mcg - concentrato per dispersione iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino
(vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 195 flaconcini multidose (1950 dosi).

Per quanto riguarda invece il **vaccino Spikevax** la relativa determina, che estende l'indicazione anche per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19 in soggetti di età pari o superiore a 6 anni, prevede la dose di richiamo (0,25 ml contenente 50 microgrammi di mRNA ovvero metà della dose primaria) almeno tre mesi dopo il completamento del ciclo primario.

Spikevax può essere usato come richiamo negli adulti che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario con Spikevax oppure un ciclo primario comprendente un altro vaccino a mRNA o un vaccino a vettore adenovirale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1507/001 A.I.C.: 049283017/E In base 32: 1GZZY9

0,5 ml - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare- flaconcino
(vetro) 5 ml (10 dosi da 0,5 ml) - 10 flaconcini multidose (100 dosi).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)